

ΑΙΜΩΔΙΕΣ

Διαφορική Διάγνωση	Κλινικά συμπτώματα	Εργαστηριακές εξετάσεις
Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια	<ul style="list-style-type: none"> • Η κεφαλαλγία συνήθως απουσιάζει • Τα επεισόδια διαρκούν συνήθως από λεπτά έως ώρες, αλλά οπωσδήποτε κάτω από 24 ώρες • Πρέπει να γίνει έλεγχος για παρουσία εμβόλων, όπως λχ στην κοιλιακή μαρμαρυγή 	<ul style="list-style-type: none"> • Doppler καρωτίδων • ΗΚΓ • Υπερηχογράφημα καρδιάς
Υπεραερισμός	<ul style="list-style-type: none"> • Σχετίζεται με άγχος και κρίσεις πανικού • Μπορεί να συνοδεύεται από αιμωδία που εντοπίζεται περιτοματικά, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα • Μπορεί να σχετίζεται με σπασμούς χεριών και ποδιών, εφιδρώσεις και αίσθημα ζάλης 	<ul style="list-style-type: none"> • Τα αέρια αίματος φανερώνουν υποκαπνία χωρίς υποξαιμία
Ημικρανία	<ul style="list-style-type: none"> • Τα αισθητικά συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά και συνοδεύονται από ετερόπλευρη παροξυσμική κεφαλαλγία, ναυτία, εμέτους και φωτοφοβία 	
Κατά πλάκας σκλήρυνση	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτοάνοση νόσος αγνώστου αιτιολογίας, που αποτελεί την κυριότερη απομυελινωτική πάθηση του νευρικού συστήματος • Έχει πολύμορφη συμπτωματολογία και περιλαμβάνει κινητικές, αισθητικές και αισθητηριακές διαταραχές, η εξέλιξη των οποίων γίνεται κατά ώσεις • Υπάρχει τάση μείωσης των υποτροπών στη διάρκεια της κύησης, αλλά οι υποτροπές αυξάνουν τους 3 πρώτους μήνες της λοχείας 	<ul style="list-style-type: none"> • MRI εγκεφάλου
Νευροπάθειες	<p>Η εντόπιση του συμπτώματος εξαρτάται από την περιοχή νεύρωσης του πάσχοντος νεύρου:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: αποτέλεσμα πιεστικής βλάβης του μέσου νεύρου. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πόνο, υπαισθησία και αιμωδία που επηρεάζει τους τρεις πρώτους δακτύλους και εξασθενεί τις κινήσεις του αντίχειρα. Τα συμπτώματα είναι αμφοτερόπλευρα και επιδεινώνονται τη νύχτα • Παράλυση του Bell: πρόκειται για ιδιοπαθή παράλυση του προσωπικού νεύρου αγνώστου αιτιολογίας. Είναι 2-3 φορές συχνότερη στη διάρκεια της κύησης. Εκδηλώνεται συχνότερα τις 2 τελευταίες εβδομάδες της κύησης και τα κύρια συμπτώματα είναι η παράλυση των μυών του προσώπου ομόπλευρα με τη βλάβη και οι αισθητηριακές διαταραχές της γεύσης και της ακοής. • Παραισθητική μηραλγία: Είναι συνήθως αποτέλεσμα συμπίεσης του μηριαίου νεύρου, που εκδηλώνεται κλινικά με αιμωδίες και μυρμηκιάσεις στην πρόσθια και έσω επιφάνεια του μηρού. Παρουσιάζεται συνήθως στο 3^ο τρίμηνο και υποχωρεί μετά τον τοκετό • Βλάβη του οσφυοϊερού στελέχους (ειδικά O4 και O5): Παρουσιάζεται στη λοχεία με ετερόπλευρη πτώση του ποδιού και αιμωδία, και/ή άλγος στην περιοχή νεύρωσης των σύστοιχων ριζών. Περισσότερο πιθανό σε γέννηση νεογνών μεγάλου βάρους, με χρήση εμβρυουλκού και σε κεφαλοπυελική δυσαναλογία 	<ul style="list-style-type: none"> • Ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες