

ΚΟΛΠΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΑ

Διαφορική Διάγνωση	Κλινικά συμπτώματα	Εργαστηριακές εξετάσεις
Σταγονοειδής	<ul style="list-style-type: none"> Σε μερικές περιπτώσεις, σε φυσιολογικές κυήσεις, ενδέχεται να παρατηρηθεί σταγονοειδής αιμόρροια από τον κόλπο (spotting) Οφείλεται στη λύση του φθαρτού στο σημείο της εμφύτευσης και δεν έχει κλινική σημασία 	
Απειλούμενη αποβολή	<ul style="list-style-type: none"> Συνήθως στο 1^ο τρίμηνο της κύησης Μπορεί να συνδυάζεται με κοιλιακό άλγος 	<ul style="list-style-type: none"> Διακολπικό υπερηχογράφημα
Έκτοπη κύηση	<ul style="list-style-type: none"> Εμφανίζεται 4-8 εβδομάδες από την ΤΕΡ Μπορεί να συνοδεύεται από άλγος που εντοπίζεται στην κάτω κοιλία ή στην πύελο 	<ul style="list-style-type: none"> Διακολπικό υπερηχογράφημα Μέτρηση β-HCG
Προδρομικός πλακούντας	<ul style="list-style-type: none"> Το πρώτο σύμπτωμα του προδρομικού πλακούντα είναι η ξαφνική εμφάνιση ανώδυνης αιμορραγίας από τον κόλπο Εκδηλώνεται συνήθως στο 2^ο ή 3^ο τρίμηνο της κύησης Σε περισσότερο από 10% των περιπτώσεων συνυπάρχει πρόωρη αποκόλληση 	<ul style="list-style-type: none"> Διακολπικό υπερηχογράφημα Καρδιοτοκογράφημα
Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα	<ul style="list-style-type: none"> Μπορεί να εκδηλωθεί σε όλη τη διάρκεια της κύησης, όμως ο όρος χρησιμοποιείται μετά την 20^η εβδομάδα και κυρίως στο 3^ο τρίμηνο Αφορά το 7% περίπου των κυήσεων Μπορεί να είναι μερική, ολική ή περιφερική Ο κυριώτερος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η υπερτασική νόσος της κύησης Εκδηλώνεται κλινικά με κολπική αιμορραγία, κοιλιακό άλγος, ευαισθησία και σύσπαση της μήτρας 	<ul style="list-style-type: none"> Διακολπικό υπερηχογράφημα Καρδιοτοκογράφημα
Τραχηλικός πολύποδας	<ul style="list-style-type: none"> Εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών Ενίοτε συνυπάρχει με κύηση Μπορεί να είναι ασυμπτωματικός, ή να εκδηλώνεται με κολπική αιμόρροια ποικίλης έντασης 	